

MÉDECINE INTERNE – MÉD-INT-1 (TROMBOPHLÉBITE PROFONDE)

Professionnelle habiletée :	Infirmière de l'Accueil clinique
Clientèle visée :	Usager présentant une possibilité de thrombophlébite
Indications :	Usager admissible à l'Accueil clinique qui nécessite une investigation en médecine interne pour thrombophlébite profonde.
Contre- indications :	<ul style="list-style-type: none"> • Usager déjà anticoagulé • Douleur non soulagée par les analgésiques • Hémorragie cérébrale < 3 mois • Grossesse • Néoplasie active • Poids > 150 kg • Troubles hépatiques • Signes d'embolie pulmonaire : Pls > 120, Sa O2 < 90 % douleur thoracique, dyspnée au repos • Thrombocytopénie < 70 • Hémorragie active (hémoptysie, rectorragie, méléna, hématurie) • ATCD de HIT (thrombopénie induite à l'héparine)
Directives :	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer l'ordonnance collective : OC-HFPM/xarelto (s'il y a lieu) • L'infirmière appelle le patient 6 jours plus tard pour évaluation si TPP positive. Elle évalue l'œdème, douleur M.I. et les signes d'embolie pulmonaire.
Conditions :	Répondre aux critères d'admissibilité de l'Accueil clinique et être évalué par l'infirmière de l'Accueil clinique

